

## **Cuidado del Ternero en Clima Frío**

### **Lista de Verificación**

¿Está aplicando procedimientos de cuidado efectivos con becerros en clima frío? ¿Estos procedimientos le dan a sus empleados la oportunidad de proveer cuidados de calidad?

Consideremos sus procedimientos de cuidado de terneros en climas fríos. Compare sus acciones con los estándares que se proporcionan en esta lista de verificación. Al realizar la evaluación, me gusta utilizar los siguientes parámetros:

1=nunca, 2=rara vez, 3=a menudo, 4=usualmente, 5=casi siempre.

\_\_\_\_\_ 1. Alimento a los terneros con por lo menos 4 cuartos de calostro limpio de alta calidad, no más de 6 horas después del parto.

\_\_\_\_\_ 2. Para terneros que consumen básicamente una ración líquida, proporciono suficiente alimento, leche/ sustitutos de leche, apropiado a la temperatura ambiental para proveer suficiente energía para mantenerse y para fomentar por lo menos una libra de crecimiento por día.

\_\_\_\_\_ 3. Para terneros que toman una ración combinada de líquido e iniciador para terneros, proporciono alimento a base de grano de iniciación para terneros, seleccionado libremente.

\_\_\_\_\_ 4. Proveo de agua común a los terneros tanto en clima con temperaturas de congelación como en clima normal.

\_\_\_\_\_ 5. Durante clima frío, seco el pelambre del becerro al momento del parto suficientemente para reducir la pérdida de calor a causa de la evaporación.

\_\_\_\_\_ 6. Durante clima frío en el granero de los terneros, proveo un intercambio adecuado de aire (15 pies cúbicos por minuto/mínimo/ternero) sin crearles corrientes de aire a los terneros en forma individual.

\_\_\_\_\_ 7. En todo aposento en clima frío, mantengo un lecho adecuado de paja seca debajo de los terneros para aislarlos de la base fría. Se pierde mucho valor de aislamiento de la cama de paja cuando ésta se encuentra mojada. Una cama de paja mojada pierde tres veces más calor que una que se encuentre seca.

\_\_\_\_\_ 8. En todo aposento en clima frío, controlo las pérdidas de convección ya sea con una cama de paja mullida para permitir el “anidamiento” o con el uso de cobijas para el ternero.

Sam Leadley, Calf & Heifer Management Specialist

[sleadley@yahoo.com](mailto:sleadley@yahoo.com) [www.atticacows.com](http://www.atticacows.com)

For Calves with Sam blog go to [dairycalfcare.blogspot.com](http://dairycalfcare.blogspot.com)

© Attica Vet. Assoc. 2018 All Rights Reserved.

Traducción por Karla Parra